



Maxforce[®] WHITE IC



INSETICIDA ISCO GEL

Descrição do produto

Isco em gel indicado para os tipos de baratas mais usuais, para aplicação local na forma de gotas mediante pistola aplicadora. Graças à sua formulação especial, o produto é altamente essencial em qualquer programa de manutenção, e a sua persistência após a aplicação pode chegar a vários meses.

Espectro de ação

RASTEJANTES

Baratas multiespécies (adultos e ninfas):

- // Barata germânica ou alemã (*Blattella germanica*)
- // Barata de faixa castanha (*Supella longipalpa*)
- // Barata comum, oriental ou preta (*Blatta orientalis*)
- // Barata americana ou vermelha (*Periplaneta americana*)



Barata
germânica
ou alemã



Barata
de faixa
castanha



Barata comum,
oriental ou
preta



Barata
americana
ou vermelha

Perigo e prudência



ATENÇÃO

ADVERTÊNCIAS DE PERIGO

- H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- EUH208: Contém 1,2 benzoisotiazolin-3-ona. Pode provocar uma reação alérgica.
- EUH401: Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA

- P273: Evitar a libertação para o ambiente.
- P391: Recolher o produto derramado.
- P501: Eliminar o conteúdo e/ou recipiente através de um gestor de resíduos perigosos autorizado, em conformidade com a legislação vigente.

Cenários de utilização

- // Zonas industriais/comerciais.
- // Áreas domésticas/áreas privadas.
- // Edifícios públicos (p. ex. hospitais, residências assistidas).

Dados

Registro: DGS mpr-117/2019.

Composição: Imidaclopride 2,217%.

Formulação: Gel inseticida em forma de isco – pronto a utilizar (RB)

Apresentação: Blister com 4 cartuchos de 30 g.

Período de estabilidade do produto: 2 anos.

Equipamento de proteção



Proteção das mãos: Luvas de proteção em conformidade com a diretiva EN374:

- Material: Borracha de nitrilo.
- Taxa de permeabilidade: > 480 min.
- Espessura das luvas: > 0,4 mm.



Proteção dos olhos: Usar óculos de proteção (em conformidade com EN166, domínio de utilização = 5 ou homologação equivalente).



Proteção da pele e do corpo: Utilizar uma bata standard e fardamento da categoria 3 tipo 6. Em caso de risco de exposição significativa, utilizar vestuário de alta proteção. Utilizar duas camadas de roupa sempre que possível. As batas de Poliéster/ Algodão ou Poliéster total deverão ser utilizadas sob o fato de proteção química e ser frequentemente tratadas por uma Lavandaria Industrial. Se o fato de proteção química está salpicado, pulverizado ou significativamente contaminado, descontamine-o na medida do possível, e de seguida retire-o cuidadosamente e elimine-o de acordo com as indicações do fabricante.

Certificações

- // Formulação isenta de óleo de palma.

Doses e utilizações autorizadas

Âmbito de utilização	Método de aplicação	Categoria de utilizador	Prazo de reentrada	Espectro de ação	Pontos a aplicar por m ² , dependendo do grau de infestação		Frequência
					Baixa	Alta	
Interiores	Localizada em forma de gota. Com seringa doseadora	Profissional	Não aplicável	Barata pequena (alemã ou de faixa castanha)	•	• •	Máximo de 3 a 11 repetições de aplicações por ano por edifício*
				Barata grande (oriental ou americana)	• •	• • •	

* Taxa máxima de aplicação de 3 pontos x 0,1 g por metro quadrado, com uma repetição máxima de aplicação de 3-11 vezes por ano por edifício:

- 60 pontos x 0,1 g (ou seja, 6 g de isco) numa casa.

- 270 pontos x 0,1 g (ou seja, 27,9 g de isco) no máximo num edifício de maior dimensão.

Se forem necessárias quantidades maiores de isco, deve ser utilizado um porta-iscos em espaços interiores.

Instruções de utilização

Maxforce® White IC, possui uma aplicação localizada sob a forma de pontos ou bandas finas nas superfícies das áreas-alvo identificadas. Pode ser colocado em esquinas, fendas, fissuras e orifícios.

O produto é aplicado com um aplicador de gel adequado. Uma vez concluído o tratamento, remova o cartucho vazio e elimine-o em segurança. Se o cartucho tiver sido utilizado apenas parcialmente, remova-o do aplicador, feche-o com a tampa fornecida e armazene-o de acordo com as instruções.

A dose de aplicação deve ser ajustada ao tamanho da infestação: um ponto = 0,1 g (aproximadamente 7 mm de diâmetro).

De forma alternativa, pode ser aplicada uma banda fina equivalente a um ponto.

Utilize os biocidas de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação sobre o biocida antes de o usar.

Outras recomendações de utilização

- // Não aplique diretamente sobre as superfícies onde são armazenados, preparados ou consumidos alimentos.
- // Perigoso para as abelhas.
- // Não aplique sobre superfícies sujeitas a limpeza húmida e sistemática.
- // Não elimine o produto não utilizado no solo, em cursos de água, em canos (no lavatório ou na sanita...) nem no cano de esgoto.
- // Não aplique sobre superfícies sujeitas a limpeza húmida e sistemática.
- // Se eliminar qualquer isco residual endurecido com uma esponja ou um pano húmido, todos os materiais utilizados (esponjas, panos, etc.) devem ser eliminados de forma segura como lixo doméstico.
- // Em caso de reinfestação, aplique novamente o produto sem exceder o número máximo de tratamentos autorizados por ano.
- // Antes do tratamento, remova todas as outras fontes de comida das baratas (lixo, restos de comida,...) da área infestada para favorecer a ingestão do gel.
- // Alterne produtos que contenham substâncias ativas com mecanismos de ação diferentes.
- // Adote métodos integrados de controlo de pragas, como a combinação de métodos químicos e físicos e outras medidas de saúde pública.
- // Não aplique o produto em superfícies absorventes.
- // Não exponha as gotas de isco à luz solar ou ao calor (por exemplo, radiadores).



Bayer Cropsience (Portugal)
Produtos para a Agricultura, Lda
Rua Quinta do Pinheiro, nº5
2794 - 003 Carnaxide
Tel: +351 21 417 21 21
www.es.bayer.pt