



ADUBO NPK com magnésio, boro e zinco

AMAFLORES AZUL 12-12-17(+2 MgO)

ADUBO CE

Composição

Azoto total (N): 12%

Azoto nítrico (NO₃): 5%

Azoto amoniacal (NH₄): 7%

Pentóxido de fósforo (P₂O₅): 12%

Solúvel em citrato de amónio neutro e água

Pentóxido de fósforo solúvel em água (P₂O₅): **7,8 %**

Óxido de potássio (K₂O): 17%

Solúvel em água

Óxido de magnésio (MgO): 2%

Solúvel em água

Enxofre total (S): 20 %

Trióxido de enxofre (SO₃): 16%

Solúvel em água

Boro total (B): 0,02%

Zinco total (Zn): 0,01%

Pobre em cloro

Recomendações de uso:

Adubo granulado completo, com uma composição equilibrada que permite a sua utilização quer como adubo de fundo, quer em adubações de cobertura.

Adubo com micronutrientes que previnem o aparecimento de carências, e magnésio, essencial para o desenvolvimento das plantas.

Adubo com efeito rápido e permanente, estimulando um rápido crescimento, bom rendimento e boa qualidade das culturas. Estimula a floração e cor das plantas assim como um desenvolvimento completo das frutas e verduras, tanto em volume como no sabor e aroma.

Confere às plantas maior resistência a doenças e pragas.

Misturar o adubo com a terra antes da plantação ou colocar à superfície do terreno ou vaso, enterrando-o ligeiramente não o pondo em contacto com a planta; o adubo é dissolvido lentamente pela água de rega.

Cultura	Dose (g/m²)	Modo de Emprego
Abóbora	80-100	1/2 antes da sementeira, 1/2: 4 semanas depois
Aipo	60-100	1/2 à plantação, 1/2: 6 semanas depois
Alcachofra	100-120	1/2 com a preparação do solo, 1/2: 4 a 6 semanas depois
Alface	70-90	Antes da sementeira ou plantação

Arbustos Ornamentais	80-12	2/3 na primavera, 1/3 no crescimento
Batateira	70-90	2/3 antes da plantação e 1/3 por altura da amontoa
Cenoura	60-100	1/2 à plantação, 1/2, 6 semanas mais tarde
Couves (geral)	100-180	em 3 porções: à plantação, 4 e 8 semanas mais tarde
Crisântemo	70-100	2/3 antes da plantação ou sementeira e 1/3 no crescimento
Dália	80-100	2/3 antes da plantação, 1/3 - 6 semanas depois
Espinafres	70-90	Antes da sementeira ou plantação
Gladíolos, Dálias	80-100	2/3 antes da plantação, 1/3 - 6 semanas depois
Meloeiro	80-100	1/2 antes da sementeira, 1/2: 4 semanas depois
Morangueiro	50-80	1/3 no início da primavera, 2/3 depois da colheita
Ornamentais em vaso	1-3 g/L	Em vasos, 1 a 2 vezes por ano, 1 a 3 g (0,5 a 1 colher de café rasa) por cada litro de capacidade do vaso
Pepino, beringela	80-100	1/2 antes da sementeira, 1/2: 4 semanas depois
Relvados	150-200	1/5 na primavera; o resto em 4 a 6 porções alguns dias após os cortes
Roseira	120-140	2/3 na primavera e 1/3 no crescimento
Tomateiro	100-120	1/2 com a preparação do solo, 1/2: 4 a 6 semanas depois
Túlipas, Narcisos	50-70	2/3 antes da plantação, 1/3 na primavera
Videira	50-85	2/3 no início da primavera, 1/3 no início do verão

Peso líquido: 5 kg

Distribuído por:
Liscampo, Lda
Travessa do Carvalho, 31-35
1200-097 Lisboa PORTUGAL
Tlf. + 351 21 347 12 71
Fax. + 351 21 347 81 70
www.liscampo.com